

Czym są badania przesiewowe raka jelit?

Badania przesiewowe raka jelit NHS pomagają ustalić, czy możesz mieć raka jelit. Mogą one zapobiec wystąpieniu raka jelit lub wykryć go na wczesnym etapie, na którym leczenie jest prostsze.

NHS wysyła darmowe zestawy do badań przesiewowych raka jelita umożliwiające pobranie małej próbki stolca. W laboratorium sprawdzimy ją pod względem obecności śladów krwi.

Krew może być objawem polipów lub raka jelit. Polipy to narośla wewnątrz jelita, które z czasem mogą zamienić się w nowotwór. Jeśli coś zostanie wykryte, zaprosimy cię na dalsze badania, zazwyczaj w szpitalu.

Jeśli zauważysz jakieś objawy raka jelit, niezależnie od swojego wieku powinieneś (/naś) skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu, nawet jeśli niedawno robiłeś (/aś) test przesiewowy.

Dlaczego oferujemy testy przesiewowe raka jelit?

Rak jelit to jeden z najczęstszych rodzajów nowotworów a regularne testy przesiewowe pomagają mu zapobiec lub wykryć go na wczesnym etapie, gdy leczenie jest prostsze.

Dla kogo przeznaczone są testy przesiewowe raka jelit?

Testy te są przeznaczone dla wszystkich mieszkańców Londynu w wieku od 56 do 74 lat, stopniowo obniżając granicę wieku do 50 lat przed rokiem 2025. Gdy nadejdzie twoja kolej, co dwa lata, otrzymasz zestaw do testów przesiewowych. Za każdym razem powinieneś (/naś) go zrobić i odesłać.

Jak mogę otrzymać domowy zestaw do testów przesiewowych?

Każda osoba w Anglii zarejestrowana u lekarza pierwszego kontaktu automatycznie otrzyma zestaw testowy na swój adres domowy.

Kiedy dostanę swoje wyniki?

Wyniki zostaną ci przesłane w ciągu dwóch tygodni. Powiadomimy cię czy konieczne będą jakiegokolwiek dalsze badania. Dodatkowe badania nie oznaczają jednak, że masz raka jelit.

Help us
help you

Screening
saves
lives


Darmowa linia wsparcia:
0800 707 6060

Jeśli otrzymasz od NHS zestaw do badań
przesiewowych raka jelit,
połóż go obok toalety.
Nie odkładaj go na później.


SHN

Jak korzystać z zestawu do badań przesiewowych raka jelit

1. Zapisz na butelce z próbką bieżącą datę
2. Skorzystaj z pojemnika lub kilku warstw papieru toaletowego, by złapać swój stolec
3. Upewnij się, że stolec nie miał kontaktu z wodą w toalecie
4. Otwórz zakrętkę butelki na próbkę
5. Pobierz próbkę zbierając patyczkiem stolec w taki sposób, aby pokryte były wszystkie rowki
6. Aby wykonać test, potrzebna jest tylko odrobina stolca. Nie dodawaj go więcej.



7. Umieść patyczek z powrotem w butelce i wciśnij zakrętkę, by ją zamknąć
8. Po użyciu nie otwieraj butelki ponownie
9. Umyj ręce zaraz po teście
10. Umieść butelkę z próbką w dołączonej do zestawu opłaconej z góry kopercie
11. Oderwij taśmę, zamknij kopertę i wyślij ją pocztą
12. Możesz spodziewać się wyników badania w ciągu dwóch tygodni



Jeśli otrzymasz od NHS zestaw
do badań przesiewowych raka
jelit, połóż go obok toalety.
Nie odkładaj go na później.

nhs.uk/bowel-screening